



velactis®


Kde všechno začíná

ZASUŠOVÁNÍ
DOJNIC

MANAGEMENT

ZDRAVOTNÍ STAV
MLÉČNÉ ŽLÁZY

WELFARE



DRY YOUR
BEST

www.dryyourbest.com

Velactis 1,12 mg/ml injekční roztok pro skot. Jeden ml obsahuje Cabergolinum 1,12 mg v 1 ml. **INDIKACE:** Pro použití v programu péče o stádo dojnic, jako pomoc při řízeném zaprahování pro náhlé zasušení dojnic a snížení produkce mléka v období stání na sucho, Snížení rizika vzniku nových intramamárních infekcí během období stání na sucho, Snížení diskomfortu dojnic po zasušení). Cílový druh zvířat: Skot (dojnice). Dávkování a způsob podání: Intramuskulární podání. Doporučená dávka je 5,6 mg cabergolinu (odpovídá 5 ml injekčního roztoku) na zvíře v jednorázové injekci v den zasušení po posledním dojení. Přípravek by měl být podán během 4 hodin po posledním dojení. Ochranná lhůta: Maso: 23 dnů, Mléko: po otelení bez ochranných lhůt, pokud období stání na sucho trvalo 32 a více dnů. 4 dny (8 dojení) po otelení, pokud období stání na sucho trvalo méně než 32 dnů.

CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA s.r.o., Račianska 153, Bratislava 831 53, E-mail: ceva@ceva-ah.sk

